Wells-Score für Lungenembolie

Bestimmung der klinischen Wahrscheinlichkeit einer Lungenembolie

Name: _____ Datum: _____

Geburtsdatum: _____ Untersucher: _____

Klinische Charkateristik	**Score**
Symptome einer Tiefen Venenthrombose (TVT)	3,0
Keine alternative Diagnose liefert eine bessere Erklärung für die Erkrankung	1,0
Tachykardie mit einem Puls von > 100	1,5
Immobilisation ≥ 3 Tage) oder Operation in den vorhergehenden vier Wochen	1,5
TVT oder Lungenembolie in der Anamnese	1,5
Hämoptyse vorhanden	1,0
Malignität vorhanden	1,0
Gesamtpunktzahl	

Auswertung des Scores:

Bewertung > 6:	hohe Wahrscheinlichkeit
Bewertung ≥ 2 und ≤ 6:	mäßige Wahrscheinlichkeit
Bewertung < 2:	geringe Wahrscheinlichkeit

Literatur:

Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer. Thromb Haemost. 2000 Mar;83(3):416-20. PubMed ID: 10744147

DIGOTOR GmbH
Fortbildungen für Orthopädische Medizin und Manuelle Therapie
Frank Diemer · Nedeljko Goreta · Volker Sutor
Austraße 30 · D-74336 Brackenheim
info@digotor.info www.digotor.info www.facebook.com/digotor.info www.instagram.com/digotor.fortbildungen