Wells-Score – Tiefe Venenthrombose (TVT)

Bestimmung der klinischen Wahrscheinlichkeit einer tiefen Venenthrombose

Name: _____ Datum: _____

Geburtsdatum: _____ Untersucher: _____

Klinische Charkateristik	Score
Aktive Krebserkrankung	1,0
Lähmung oder kürzliche Immobilisation der Beine	1,0
Bettruhe (> 3 Tage); große Chirurgie (< 12 Wochen)	1,0
Schmerz/Verhärtung entlang der tiefen Venen	1,0
Schwellung ganzes Bein	1,0
Unterschenkelschwellung > 3 cm gegenüber Gegenseite	1,0
Eindrückbares Ödem am symptomatischen Bein	1,0
Kollateralvenen	1,0
Frühere, dokumentierte tiefe Venenthrombose	1,0
Alternative Diagnose mindestens ebenso wahrscheinlich wie tiefe Venentrombose	- 2,0
Gesamtpunktzahl	

Auswertung des Scores:

- 0 Punkte oder weniger: TVT unwahrscheinlich (D-Dimer-Test sinnvoll)
- 1 - 2 Punkte: Mittleres Risiko (D-Dimere und evtl. Ultraschall empfohlen)
- ≥ 3 Punkte: TVT wahrscheinlich (Ultraschall/Phlebografie notwendig)

Wichtiger Hinweis:

- D-Dimere sind nur sinnvoll, wenn der Wells-Score niedrig ist, da sie auch durch andere Faktoren erhöht sein können (z. B. Infektion, Trauma, Schwangerschaft).
- Bei hohem Score ist eine direkte Bildgebung (Ultraschall) die Methode der Wahl.

Literatur:

P. S. Wells, D. R. Anderson, M. Rodger, I. Stiell, J. F. Dreyer, D. Barnes, M. Forgie, G. Kovacs, J. Ward, M. J. Kovacs: Excluding pulmonary embolism at the bedside without diagnostic imaging: management of patients with suspected pulmonary embolism presenting to the emergency department by using a simple clinical model and d-dimer. In: Ann Intern Med. Band 135, Nr. 2, 17. Jul 2001, S. 98–107. PubMed PMID 11453709.

DIGOTOR GmbH
Fortbildungen für Orthopädische Medizin und Manuelle Therapie
Frank Diemer · Nedeljko Goreta · Volker Sutor
Austraße 30 · D-74336 Brackenheim
info@digotor.info www.digotor.info www.facebook.com/digotor.info www.instagram.com/digotor.fortbildungen